



Prontosan®

OPTIMAL RENGÖRING AV SÅRET.

Problemet – Biofilm

Traditionell sårrengöring med koksalt och vatten är i många sår ineffektivt för att avlägsna sårbeläggningar och speciellt komplexa biofilmer.

FAKTA: Över 90% av svårläkta sår har biofilm, som är ett stort hinder för sårsläkning.¹


ÖVER
90%
AV SVÅRLÄKANDE
SÅR HAR BIOFILM¹

VAD ÄR BIOFILM?

Biofilm bildas när bakterier fäster till ytan genom utsöndring av en tjock, slemmig och klisterliknande substans känd som Extracellulär Polymerisk Substans (EPS).

Denna substans bildar ett skyddande lager, där bakterier inte längre kan röra sig fritt (planktonisk), men fäster till sårbedden. Nya bakterier produceras och kolonin växer under skyddet av EPS.

Biofilm är ofta svåra att upptäcka visuellt men fördröjer sårsläkningen genom att de skyddar bakterierna i sårbedden.²



HUR UTVECKLAS BIOFILMER?²

KONTAMINERING


Fritt flytande bakterier fäster till ytan inom några minuter.

SPRIDNING LEDER TILL SYSTEMISKA INFEKTIONER

Mogen biofilm frisätter och sprider bakterier inom 2-4 dagar och orsakar rekolonisering vilket resulterar i en oavbryten biofilmscykel.

KOLONISERING

Bakterier formerar sig och får fäste inom 2-4 timmar.



UTVECKLING AV BIOFILM OCH INFLAMMATIONSRESPONS HOS VÄRDEN

Utvecklar initialt EPS och bli i ökande grad motståndskraftig inom loppet av 6-12 timmar.

Lösningen – Principer för prevention och behandling av biofilm

Prevention och behandling av biofilm i svårhelande sår har blivit ett primärt mål vid sårbehandling då kunskapen om biofilm är en orsak till försämrad sårhelning.³ Prontosan® lösning och Prontosan® Gel är en av få produkter som är speciellt indikerade för avlägsnande och förebyggande av biofilm. Prontosan® innehåller två nyckelingredienser: Betain och Polihexanid.

BETAIN

En mild och effektiv surfaktant (tensid) som kan penetrera, förstöra, rengöra och avlägsna biofilm och beläggningar i såret.




Fig. 4: Prontosan® is composed of two components: Betaine (shown here as green pin-needles) and polyhexanide (not shown in this figure). Betaine is a surfactant. Surfactants consist of a hydrophilic, water-attracting head, and a water-repellent, hydrophobic hydrocarbon body. The polar heads of the surfactant molecules have the same electric load and therefore repel each other. This is how the biofilm is cracked.





Fig. 5: After the betaine has broken up the wall of the biofilm („blasting open the brick wall“), the polyhexanide (P) can subsequently enter the biofilm and performs an adjunct antimicrobial effect.

POLIHEXANID (PHMB)

Polihexanid är en högeffektiv bredspektrum antiseptisk substans som är aktiv mot gram negativa och gram positiva bakterier och jäst, inklusive MRSA, Pseudomonas aeruginosa, VRE, etc¹⁰. Polihexanid har varit i generellt bruk i ca 60 år och har visat en god säkerhet (se överblick på sida 5) utan någon resistensevidens och med minimal toxicitet^{13, 14, 15}. Polihexanid har lång till ingen absorptionstid av mänskliga celler och vävnad. Störningar i kroppens metabolism är därför minimal.

4



Befintlig biofilm

Mekanisk spolning med Prontosan spillösning

Betaine löser upp biofilm (avlägsnar skräp och sårbeläggning)

Polihexanid som adjutant antiseptisk substans

Såret är rengjort, skräp avlägsnat, debriderat, dekontaminerat och fritt från biofilm

Prontosan[®] Bryter biofilmcykeln

Använd kombinationen Prontosan[®] Sårspollösningar och Prontosan[®] Sårgel / Sårgel X proaktivt vid sårrengöring för att:

- Reducera biofilm (**Prontosan[®] Wound Irrigation Solution**)
- Förebygga återväxt av biofilm (**Prontosan[®] Sårgel / Sårgel X***)

LÄMPLIG VERKNINGSTID FÖR OLIKA TYPER AV


SVÅRLÄKANDE SÅR - EPITELISERANDE

Spola med lösning

- Ingen sårbeläggning
- Minimalt vätskande
- Bräcklig, epitelerad vävnad



- Rengör
- Förebygger biofilm / komplikationer



SVÅRLÄKANDE SÅR - GRANULERANDE

Spola med lösning

Applicera Gel / Gel X*

- Lätt sårbeläggningar
- Svagt vätskande



- Mekaniskt lösgör skräp/sårbeläggningar (idealt att använda Prontosan[®] Debridement Pad)
- Bidrar till ren sårbedd




SVÅRLÄKANDE SÅR - KRITISKT KOLONISERAT/INFEKTERAT

Spola med lösning

Applicera Gel / Gel X*

- Sårbeläggningar
- Måttligt / Kraftigt vätskande
- Ej läkande sår



- Mekaniskt lösgör skräp/sårbeläggningar (idealt att använda Prontosan[®] Debridement Pad)
- Bidrar till ren sårbedd
- Reducerar lukter



* Applicera Prontosan[®] Gel i sår med kaviteter, samt Sårgel X på stora sårytor

Kompatibel med andra förband.

Prontosan[®] Sårspollösning och Prontosan[®] Sårgel / Sårgel X kan användas upp till 8 veckor efter öppnande (patientbundet).

STUDIE	TYP	KONKLUSION
Bellingeri et al., (2016), Effect of a wound cleansing solution on wound bed preparation and inflammation in chronic wound: a single-blind RCT, Journal of Wound care	RCT	The results of this RCT with 289 subjects confirms the superiority of Prontosan® Wound Irrigation Solution compared to Saline in efficacy as it promotes the wound bed preparation, supports thereduction of inflammatory signs and accelerates the healing of vascular leg ulcers as well as pressure ulcers.
Romanelli M, et al., (2008), Evaluation of the efficacy and tolerability of a solution containing Betaine and PHMB in controlling the bacterial burden of chronic wounds during wound bed preparation	RCT	The results of the RCT with 40 subjects show that the pH value of the wound was significantly ($p<0.05$) lower and that pain control was achieved ($p<0.05$) in the Prontosan treatment group compared to the Saline group Saline group which was the control.
Valenzuela et al., (2008), The effectiveness of a 0.1% polyhexanide gel. Rev ROL Enf;31(4):247-52.	RCT	Both groups were comparable at the start of the study and the results obtained in the final assessment of lesions were as follows: Reversal of positive cultures ($p=0.004$), improvement in the healing process ($p=0.000$), reduction in lesion surface area ($p=0.013$); improvement in granulated tissue % ($p=0.001$), reduction in the % of slough in wound beds ($p=0.002$), reduction of the presence of exudate ($p=0.008$), reduction of the presence of purulent exudate ($p=0.005$), improvement in the condition of surrounding skin ($p=0.021$), reduction in pain ($p=0.049$), reduction in erythema in surrounding skin ($p=0.004$), reduction in surrounding skin edema ($p=0.000$), reduction in surrounding skin warmth ($p=0.004$) and reduction in odor ($p=0.029$).
Cutting K, (2010), Addressing the challenge of wound cleansing in the modern era, British Journal of Nursing, 2010 (Tissue Viability Supplement), Vol 19, No 11	Review	If current thinking, that all chronic wounds are biofilm wounds (Wolcott and Rhoads, 2008), is sustained then we will need to rethink our approach to wound cleansing, as the studies examined above indicate that PHMB, in conjunction with a surfactant, is superior to isotonic solutions. In addition, there is evidence emerging that Prontosan is an effective wound cleanser in longstanding (chronic) wounds and has been found by patients to be pain-free, improve patient quality of life, effectively manage wound infection and to reduce the overall time to healing.
Butcher M., (2012), PHMB: An effective antimicrobial in wound bioburden management, British Journal of Nursing (2012) 21:12 SUPPL. (16-21).	Review	PHMB appears to meet the criteria for an ideal antimicrobial agent, as described by Drosou et al (2003), and is available in presentations that provide clinicians with effective woundcare modalities for most clinical scenarios. Clinical use, both in the UK and the wider healthcare community, has shown PHMB-based wound-care products to be effective options for managing wound colonisation and infection and, so, deserve closer scrutiny.
Dissemond J., et al., (2005), Methicilin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) in chronischen Wunden, JDDG	Review	Sufficient MRSA eradication could be shown in vivo on patients for the non- cytotoxic Polyhexanide [...] In this article we discuss current therapeutic standards and potential alternatives for eradication of MRSA. There is evident need for effective, novel approaches for elimination of MRSA from chronic wounds that avoid the development of bacterial resistance; otherwise therapeutic alternatives for antibacterial treatment of chronic wounds will become limited.
Andriessen A, Eberlein T (2008), Assessment of a wound cleansing solution in the treatment of problem wounds, WOUNDS; 20(6):171-175	Retrospective	Wounds (Venous leg ulcers) of patients treated with Prontosan® Wound Irrigation Solution healed significantly faster ($p<0.0001$) and in more cases (97% versus 89%) than the wounds of patients treated with saline solution or Ringer's solution. Additionally the infection rate for the Prontosan group was lower (13% vs. 3%)
Moller et al., (2008), Experiences in using polyhexanide containing wound products in the management of chronic wounds – results of a methodical and retrospective analysis of 953 cases, Wundmanagement; 3:112-117.	Retrospective	Treatment resulted in an improvement of 97% and a complete closure of 80% of the wounds. Infection rates declined from 40% to 3%. Prontosan® Wound Irrigation Solution and Gel were compatible with various wound dressings, induced no skin irritations, reduced odor and were accepted by the patients.
Durante et al., (2014), Evaluation of the effectiveness of a polihexanide and propyl betaine-based gel in the treatment of chronic wounds, Minerva Chirurgica; 69(5):283-292	Observational	The results of this observational study showed that the treatment of skin wounds of various kinds and types, in different ages, from pediatric age, until the geriatric age , with a polyhexanide and propyl betaine-based gel in combination with a secondary dressing showed significant improvements in the size of the wound, pain at dressing change , and wound characteristics.
Kaehn et al., (2009), In-vitro test for comparing the efficacy of wound rinsing solutions, British Journal of Nursing	In-vitro	Saline solutions were less efficient than a betaine surfactant containing wound rinsing solution in removing protein from adherent test wound coatings. Salt ions hinder the hydration of proteins and decrease protein solubility. Prontosan® Wound Irrigation Solution solubilized denatured proteins and aggregated by inclusion in betaine surfactant micelles. This is an essential property for thorough and gentle wound cleansing. Wound progress of leg ulcers was more positive when the wound was treated with Prontosan® Wound Irrigation Solution compared with saline solution. The wound antiseptic Octenisept did not seem suitable for wound cleansing because proteins were denatured and became insoluble.
Lopez-Rojas et al., (2016), In vitro activity of a polyhexanide-betaine solution against high-risk clones of multidrug resistant nosocomial pathogens, Enferm Infecc Microbiol Clin 35 (1), 12-19.	In-vitro	Prontosan® Wound Irrigation Solution has high bactericidal activity against the studied multidrug-resistant pathogens. Furthermore, this bactericidal activity occurs rapidly (1 min), within a much shorter period of time than that recommended by the manufacturer.
Hirsch et al., (2010), Evaluation of Toxic Side Effects of Clinically Used Skin Antiseptics In Vitro, Journal of Surgical Research Volume 164, Issue 2	In-vitro	Due to the cytotoxic effect of some antiseptics on human skin cells, it is advised that health care professionals balance the cytotoxicity of the medication, their antiseptic properties, and the severity of colonization when selecting a wound care antiseptic. Lavasept and Prontosan® Wound Irrigation Solution showed best result regarding antibacterial efficacy and cell toxicity, and should therefore be favored in clinical wound care.
Seipp et al., (2005), Efficacy of various wound irrigants against biofilm, ZFW; 4: 160-164.	In-vitro	As far as the clinical practice of biofilm removal based on moist management practices is concerned, our investigations attest to the superior efficacy of the surfactant and polyhexanide solution compared with isotonic saline or Ringer's solution.

Wound Bed preparation. Optimal rengöring av sårbedden.



Klinisk evidens visar att rutinmässigt bruk av Prontosan® innebär bättre resultat för patientens sårhäkning

- Förbättrad sårhäkning, inklusive förkortad sårhäkningstid⁷
- Bidrar till att förebygga komplikationer¹²
- Bidrar till mindre bruk av antimikrobiella medel och antibiotika¹¹

Prontosan® reducerar kostnader

I en modellberäkning från Storbritannien¹¹, baserad på genomsnittlig reduktion i behandlingstid för patienter med venösa bensår är kostnadsbesparingen i genomsnitt **£400** per patient vid byte från av koksalt till Prontosan® i behandlings förloppet⁸.

Analys av sårbehandlingskostnader ⁵	Kostnadsdrivare	Hur Prontosan® reducerar kostnader
40% Kostnad sjukhuspatient	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ökat antal sängdagar ■ Antal komplikationer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reducerad andel infektioner från 40% to 3%⁶ ■ Reducerade inflammatoriska tecken BWAT Score p=0.0043⁷ ■ Reduktion av bakteriell belastning⁹
40% Vårdnadstid	<ul style="list-style-type: none"> ■ Behandlingstid 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Behandlingstid minskat från 17 till 13 veckor⁸ ■ Reduktion av sårtyta. BWAT Score p=0.049. Förbättring av granulationsvävnad. BWAT Score p=0.043⁷
20% Förband	<ul style="list-style-type: none"> ■ Förbandskostnader ■ Bytesfrekvens av förband 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Förbandsbyten⁶ ■ Silverförband⁶

Bättre följsamhet

Betydelse för patienten och vårdgivare av att implementera en standardiserad metod för bättre behandling och resultat. Vid implementering av Prontosan® i era behandlingsrutiner så supporterar vi och erbjuder lämplig utbildning efter era behov.

Livskvalitet. Exempel på patientfall

"The use of Prontosan® Wound Irrigation Solution and Wound Gel X contributed to the **speedy healing** of these diabetic wounds by reducing bioburden. Their use enabled the **painless** removal of sloughy tissue within one week. The patient spoke of **increased confidence** that his wounds would heal, directly as a consequence of using Prontosan®."

Butters, V and McHugh, J. "A Case Report On The Use Of A Moistening, Cleansing, Surfactant Irrigation Solution And Gel On A Traumatic Wound On A Diabetic Patient In A Busy Acute Department.". European Wound Management Association (2012): 481.



07/07/2010



03/09/2010

"The patients quality of life improved with a **reduction in pain and a reduction in exudates levels** requiring only weekly dressings. Her mobility increased and she could begin to walk short distances again, allowing her to go out and **resume normal social activities**. The cost of wound management was reduced with only weekly visits by district nurses being required, compared to daily visits prior to intervention, and through reduced use of antibiotics"

Ovens, L. "Removal Of Biofilm In Infected Venous Leg Ulcers Using Prontosan® Wound Irrigation Solution And Gel". European Wound Management Association (2010)



03/09/2009



10/12/2009

"The benefits in terms of **increased quality of life** for this patient cannot be underestimated and as a result of the **successful wound management** this lady has now started to swim again, is looking forward to a holiday abroad with friends and most importantly is now being considered for the renal transplant list."

Hughes, Nicola. "Calciophylaxis – A Successful Outcome In Wound Management Using Prontosan". European Wound Management Association (2008)



01/04/2008



10/06/2008

"Historically, daily visits from the district nursing staff commenced in January 2001 and took one hour per day. Both the patient and his family found the visits a necessity but they felt that their lives revolved around treating the ulcers. Since commencing Prontosan®, visits from the district nurse were reduced to alternate days and the patient and his wife attended their son's wedding, with no detrimental effect to either ulcer. **This was the first time the patient had left his house to attend a social occasion for over 5 years**. It has made significant improvements to both wounds which the patient, his wife and district nursing service did not expect to see. This has **improved the patient's morale** and the results have motivated all nursing staff."

Horrocks, A. "Successful Treatment of two grade 4 pressure ulcers of 5 years duration using Prontosan® Solution and Gel. European Wound Management Association (2006)



12/04/2006



14/04/2006



17/02/2006



17/03/2006

For full case study documents please visit: www.prontosan.co.uk

Prontosan® Debridement Pad

Ett nytt tillskott för att komplettera prontosangruppen

Utformad för att ge en mjuk mekanisk debridering samt avlägsna och binda till sig fibrin, smuts och sårbeläggning. Detta bidrar till en ren sårbedd och lämnar granuleringsvävnad intakt.

EGENSKAPER

- God rengöring och debridering tack vare mikrofiberteknologin
- Mjuk debridering, ingen vävnadsirritation
- Unik droppform, som möjliggör debridering av kaviteter och svåråtkomliga sårområden
- Ett absorberade lager suger åt sig sårexudat
- Blisterförpackning för säker och aseptisk fuktning av debrideringsdynan före användning
- Ger bra resultat även på fjällande och nekrotisk beläggning, om det föregås av tidigare fuktning exempelvis Prontosanomslag

INNOVATIV FORM - DESIGNAD FÖR LYCKAT RESULTAT




Mikrofiberteknologi, Maximal rengöring

Prontosan® Debridement Pad använder den senaste teknologin inom mikrofiberrengöring. Mikrofiber är väldigt små och utvecklar elektrostatisk effekt för att binda till sig även de allra minsta partiklarna.

Varje mikrofiber har en struktur med flera strängar, vilket vilket möjliggör att många fler partiklar av smuts och sårbeläggning kan **avlägsnas** från sårbedden och binds till varje mikrofiber i dynan. Prontosan® Debridement Pad borstar inte bara bort som traditionella, mycket större, mikrofiber.

Det finns **miljontals mikrofiber** i varje Prontosan® Debridement Pad för bästa debrideringseffekt.



FÖRE OCH EFTER ANVÄNDNING AV PRONTOSAN® DEBRIDEMENT PAD



Före debridering



Efter debridering



3 veckor efter debridering

HUR MAN ANVÄNDER FÖR BÄSTA RESULTAT

1 Öppna blisterförpackningen, fukta den omärkta sidan av dynan med 15-20 ml Prontosan Sårspollösning*

2 Tryck lätt med den omärkta sidan nedåt, använd cirkulära eller svepande rörelser över området som ska debrideras

3 Skölj (med Prontosan Solution*) för att spola rent såret

4 Applicera Prontosan Gel X för att förebygga uppkomst av biofilm och applicera förband efter behov**

TIPS Omslag med Prontosan® Sårspollösning kan med fördel användas före debridering



Före



Efter

* Koksaltlösning eller sterilt vatten kan användas


** Följ lokala riktlinjer

Prontosan®

För spolning och upprensning av sår med biofilm, en förenklad guide hur du kan optimera sårrengöringen

Steg 1. Prontosan® lösningen

Såret spolas kortvarigt med Prontosan® Sårspolvätska för att ta bort lösa beläggningar. Dränk sedan in en steril kompress med Prontosan Sårspollösning och låt den ligga och dra över såret i 10–15 minuter. Därmed bryts ytspänningen i biofilmen, detta gör att upprensningen blir mer effektiv. Avsluta med att torka av såret med en ny steril kompress.



Steg 2. Prontosan® Debriment Pad

Om ni har tillgång till Prontosan® Debridement Pad kan ni använda denna för att maximera rengöringen då dess yta med microfiber har en förmåga att fånga upp och lösa micropartiklar som kan störa sårhäkningen. Öppna förpackningen, dränk paden med 20-30 ml Prontosan® Sårspollösning. Vår Pad är droppformad och tunn så att du kan välja att använda den större rundade delen för större sår eller den spetsiga delen till mindre och mer svåråtkomliga delar av såret. Debridera genom att med mjuka rörelser föra debrideringsdynan runt i såret. Efter användning skall den kasseras.



Steg 3. Prontosan® Sårgel eller Prontosan® Gel X

När såret är rengjort kan ni välja att förlänga upprensningen i såret och motverka att biofilmen tillväxer genom att applicera en av valda Prontosan® geler i såret. Applicera gelen så att den täcker sårets yta ordentligt och täck med lämpligt förband dvs ett förband som du anser passar sårets beskaffenhet. Tänk på att långvarig behandling med en fuktig gel kan öka risken för maceration av sårkanterna och dessa kan då behöva skyddas med ett barriärskydd/film.



Prontosan® Gel X mer trögflytande



Prontosan® Sårgel mer tunnflytande

När det är dags för förbandsbyte, rengör igen, utvärdera såret och om bedömning om fortsatt behandling med Prontosan® repetera enligt guide tills ni uppnått förväntat resultat.

Om ni efter 2 veckor inte ser någon förbättring i sårets status utvärdera fortsatt behandling med Prontosan®. Syftet med rengöringen är minskad sårsekretion, ett renare sår, reducerad biofilmlast, förhindrande av biofilmstillväxt och minskad risk för infektion allt för en snabbare sårhäkning.

Egenskaper

- Prontosan® har en dokumenterad effekt på biofilm och kan minska risken för infektion.
- Prontosan® löser upp och avlägsnar biofilm, cellrester, fibrinbeläggning, nekrotisk vävnad m.m.
- Prontosan® skyddar granulovävnad och epitelisering.
- Prontosan® är hållbar i upp till 8 veckor efter brutna förpackning (gäller ej 40 ml ampullen som är en engångsprodukt)

Produktprofil och användningsområden

a) akuta icke-infekterade och infekterade sår: traumatiska sår, t.ex. rivsår, bett, skär- eller krosskador, postoperativa sår. b) kroniska icke-infekterade och infekterade sår inklusive trycksår, venösa sår, diabetessår. c) termiska sår och sår orsakade av kemikalier, 1: a och 2: a gradens brännskador (Prontosan Gel X kan användas på brännskador 3:e graden) och kemiska brännskador. d) post-strålskador. e) fistlar och bölder. f) ingångar för urologiska katetrar, PEG/PEJ-rör eller dräneringsrör. g) peristomal hud.

Kontraindikationer

Prontosan® ska inte användas a) om det är känt att patienten är allergisk eller vid misstanke att patienten kan vara allergisk mot någon av substanserna i produkten. b) på CNS eller hjärnhinnorna. c) i mitten- eller innerörat. d) i ögonen. e) på hyalint brosk och vid aseptisk ledkirurgi. Om Prontosan® kommer i kontakt med aseptiskt brosk ska det omedelbart spolvas med Ringerlösning eller normal saltlösning. f) i kombination med anjoniska tensider. g) i kombination med tvål, salvor, oljor, enzymer etc. Dessa ämnen ska noggrant avlägsnas från såret före användning. h) för peritoneal tvättning eller sköljning.

Läs mer i bruksanvisningen som tillkommer i respektive förpackning

Mer information

För mer information om Prontosan och Biofilm gå gärna in på vår hemsida och läs mer om produkterna. Har ni frågor eller funderingar kring våra Prontosan produkter får ni gärna höra av er till mig.

VID PRODUKTFRÅGOR, KONTAKTA GÄRNA

Region Stockholm, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Gotland

Malin Forsberg, 072-1997655, malin.forsberg@bbraun.com

Västra Götalandsregionen och Region Värmland

Anders Lundqvist, 0709-919261, anders.lundqvist@bbraun.com

Region Östergötland, Region Örebro, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Västernorrland, Region Sörmland och Region Uppsala

Iris Didriksson, 0709-919264, iris.didriksson@bbraun.com

Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar och Region Jönköping

Babro Nilsson, 072-1997654, babro.nilsson@bbraun.com







Region Jämtland/Härjedalen:

Mats Johnsson, 0709-919272, mats.johnsson@bbraun.com



Prontosan® Spollösning & Gel / Gel X

Beställningsinformation

Produktbeskrivning	Storlek	Förpackning	Artikelnummer	Bild
Prontosan® Lösning	40 ml ampull	24	400484	
	350 ml flaska	10	400415	
	1000 ml flaska	10	400446	
Prontosan® Gel X	50 g tub	20	400517	
	250 g tub	20	400508	
Prontosan® Gel	30 ml flaska	20	400515	
Prontosan® Adapter NPWT Instillation		10	3908437	
Prontosan® Debridement Pad		3	3908456	
		10	3908457	

REFERENCES:

1. Attinger, Christopher and Randy Wolcott. "Clinically Addressing Biofilm In Chronic Wounds". *Advances in Wound Care* 1.3 (2012): 127-132. Web.
2. Phillips, PL et al. "Biofilms Made Easy". *Wounds International* 1.3 (2016): 1-6. Web.
3. Bjarnsholt T. et al. "Management of wound biofilm Made Easy". *Wounds International* 2017; 8(2). Web.
4. Bradbury, S and J Fletcher. "Prontosan Made Easy". *Wounds International* 2.2 (2016): 1-6. Web. 23 Sept. 2016.
5. Drew, Philip, John Posnett, and Louise Rusling. "The Cost Of Wound Care For A Local Population In England". *Int Wound Journal* 4.2 (2007): 149-155. Web.
6. Moller A, Kaehn K, Nolte A. Experiences with the use of polyhexanide-containing wound products in the management of chronic wounds – results of a methodical and retrospective analysis of 953 patients. *Wund Management*, 2008; 3: 112-117.
7. Bellingeri, A. et al. "Effect Of A Wound Cleansing Solution On Wound Bed Preparation And Inflammation In Chronic Wounds: A Single-Blind RCT". *Journal of Wound Care* 25.3 (2016): 160-168. Web.
8. Andriessen, AE and T Eberlein. "Assessment Of A Wound Cleansing Solution In The Treatment Of Problem Wounds". *Wounds* 20.6 (2008): 171-175. Web. 23 Sept. 2016.
9. Collier, Mark. "Evidence Of The Reduction Of Hospital Acquired Infections (HCAI'S) Following The Introduction Of A Standard Antimicrobial Wound Cleansing Solution To All Surgical Areas Within A Large Acute NHS Trust In The UK". *Wounds UK* (2014)
10. Kaehn, K Polihexanide: A Safe and Highly Effective Biocide, *Skin Pharmacol Physiol* 2010;23(suppl1);7-16
11. Data on file
12. Moore, M 0.1% Polyhexanide-Betaine Solution as an Adjuvant in a Case-Series of Chronic Wounds, *Surg Technology International*, 2016
13. Fabry, W. Et Kock, In-vitro activity of polyhexanide alone and in combination with antibiotics against *Staphylococcus aureus*. H.-J. *Journal of Hospital Infection*. 2014
14. Hirsch et al., Evaluation of Toxic Side Effects of Clinically Used Skin Antiseptics In Vitro, *Journal of Surgical Research* 2010 202010 Volume 164, Issue 2
15. Bradbury S, Fletcher J. Prontosan® made easy. www.woundsinternational.com 2011;

