

FI – Pakkaukseloste: Tietoa käyttäjälle

B. Braun Melsungen AG - 34209 Melsungen, Sakska

Ibuprofen B. Braun 200 mg infusioneeste, liuos

ibuprofeeni

Lue tämä pakkaukseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tästä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkaukseloste. Voi tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysytävää, käännä lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

- Jos havaitset haittavaikuttukset, käännä lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkaukselostessa.

Ks. kohta 4.

Tässä pakkaukselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ibuprofen B. Braun on ja mihin sitä käytetään

Ibuprofeeni kuuluu tulehduskuläkeihin lääkeyhdisteenä.

Tätä lääkettä käytetään nuorten ja vähintään 6 vuoden ikäisen lasten akutin keskivaikean kiven hyttyleiksiestön oireennuksien hoitoon ja kuumeen hyttyleiksiestön oireennuksien hoitoon silloin, kun lääkkeen antamisen laskimoon on kilpailusti perusteltavasti muut antutavat ole mahdollista.

2. Mitä Ibuprofen B. Braun -valmisteen säilyttäminen

Ibuprofen B. Braun -valmisteita ei saa antaa:

- jos olet allerginen ibuprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luettelut kohdassa 6)
- jos sinulla on jokuks illallinen reaktio, astmaa, puitomusta, nuihasa ja neren kutinaa tai kervoja
- jos sinulla on alkoholin etioliattu ibuprofeenille, esimerkiksi ympäriylialihappo (esipaino) tai muista samankaltaisista kypäriäkeleistä (tulehduskuläkeihin)
- jos sinulla on jokuks sairaus, joka sisältää verenvedon tai ateriosklerosi
- jos sinulla on tai on vähintään kaksi kerroa sennin ollut mahalaiva tai mahalaivan verenvuoto
- jos sinulla jokuks on ilmeellinen mahalaiva tai suoliston verenvuoto tai puhkeama, kun olet ottanut tulehduskuläkeihin
- jos sinulla on avoverenvuoto (avoverenvuoton vuoto) tai muu aktiivinen verenvuoto
- jos sinulla on valkeaa munuaus-, maksu- tai sydänsairaus
- jos elintilosi on vaikkei kuivunut (osketteen, ripulin tai riittämättömän nesteen saannin vuoksi)
- jos olet raskaana raskauden viimeisellä kolmanneksella.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät tästä lääkettä. Ibuprofeenin kaltaisissa tulehduskuläkeissä käytöön voi liittyä pieni sydänkohtauksia tai aivovalvausriski suurenneen, erityisesti kun niitä käytetään suurina annoksina. Suositeltu annosta ei voida hoidota eikä pölyä ylitä.

Ihoreaktiot

Vakavista ihoreaktioista on raportoitu ibuprofeenihoidon yhteydessä. Lopeta ibuprofen B. Braun -valmisteen käytäminen ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos sinulla tulee ihmottua, limakäytävänvalvoija, rakuksilta tai muita allergioita, koska nämä voivat olla hyvin vakavia ihoreaktioita.

Keskustele hoidostasi lääkärin kanssa, ennen kuin sinulle annetaan ibuprofen B. Braun -valmisteesta.

- jos sinulla on sydänongelma, kuten sydänvalvojan, vajaointa, rastusrintakupu (angina pectoris), tai jos sinulla on elutut sydänkohtauksia, sinulle on tehty phisikkareita tai sinulla on ollut sydänvalvojan etioliatti, joka johtuu aihatuoneesta tai tukeutuneesta valtimoista (ääreverenvuoton suraus) tai minkäkin muun aivovalvausriskin.

- jos sinulla on konkeja verenpiirangi, diabetes tai korkea kolesteroli, suvussasi on ollut sydänsairaus tai aivovalvauskieli tai jos tapauksi.

- jos sinulla on ollut mahalaiva tai mahaloidut pahoinvaltuudet tai puhekamaa. Näissä tapauksissa lääkäri harkitsee mahaa suojaavien lääkkeiden määriästä.

- jos sinulla on astmeen tai muu hengetysvaloitus

- jos sinulla on infektiot - kato tulee lääkempänä kohdasta "Infektiot"

- jos sinulla on muutakin - mato- ja murskuas, sekä tulee lääkäri sinulle, kuinka seuraistakin tähän.

- jos sinulla on illekkäisyys, mutta ibuprofeenin voi pahan näköistä

- jos sinulla on Chronin tauti tai haavanen paksuuslutehdus, koska ibuprofeen voi pahan näköistä

- jos sinulla on huoarvoita, ihon tunpoamista tai punoituusta tai hengetysvalkeus (tukkuhismen tunneli), lopeta lääkemästä välittämästi ja ota yhteyttä lääkärin tai sairaanhoitajan.

- jos sinulla on yesteroksi, koska komplikaatioita voi esiintyä

- jos sinulla on synonyyminen porfyriinainevalvadun hänriö (esim. aukiutti jaksotitainen porfiri)

- jos sinulla on yksi alkuoloksi sainaan kaiken saat lääkettä, mahaan, suolistoon ja keskushermostoon kohdistuvat haittavaikuttukset voivat lisääntyä

- jos sinulla on allerginen ruuna, nuba, renipolyyppi ja krooniin aiheutuva keuhkosairaus, sinulla on suurennut allergisten reaktioiden riski. Allergiset reaktiot voivat ilmetä astmatodistuksesta (esim. ikäpäiväkaste), nopeana turpoamisena (Quinicens edetema) tai ihottumana.

Tämä lääke on helposti välttää.

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (tulehduskuläkeistä), joka on erittäin oireellinen.

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (20 kg painoisille tai alle 6 vuoden ikäisille lapsille).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Tämä lääke on helposti välttää lääkemästä (2:n estäjän, samanaikaisista käytöistä).

Körförmåga och användning av maskiner

Inga särskilda förutsättningar är nödvändiga då korttidsbehandling eller akut behandling. Vid långtidsbehandling kan dock biverkningar som t.ex. trötthet och vresl förekomma, vilket kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Detta gäller särskilt i kombination med alkohol.

Du ska aldrig använda alkohol under behandling med ibuprofen eller ibuprofensäurer. Ibuprofen kan leda till utsläpp av alkohol i urinerna. En av faktorerna kan vara påverkan från förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Detta läkemedel innehåller 5% av högsta rekommenderat dagligt intag av nätrum för vuxna.

3. Hur du får ibuprofen B. Braun

Detta läkemedel ordinarer av en läkare och ges till dig av en läkare eller sjukskötars i en miljö där lämplig utsträckning finns tillgänglig.

Läkaren anpassar dosen individuellt för dig baserat på din kroppsvekt och ditt allmäntillstånd. Hos barn och ungdom baseras sig dosen av ibuprofen på kroppsvekt och ålder, 5–10 mg/kg kroppsvekt som en enkeldos upp till en maximal dosyndom om 30 mg/kg kroppsvekt:

Barn som väger 20–29 kg (6–8 år): 200 mg ibuprofen upp till 3 gånger per dygn, överstrukit inte den maximala dosyndomen om 60 mg.

Barn som väger 30–39 kg (10–11 år): 200 mg ibuprofen upp till 4 gånger per dygn, överstrukit inte den maximala dosyndomen om 80 mg.

Ungdom som väger minst 40 kg (12–17 år): 200–400 mg ibuprofen upp till 3 gånger per dygn, överstrukit inte den maximala dosyndomen om 120 mg.

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn som väger mindre än 20 kg eller som är yngre än 6 år.

Vid bestämning av doseringsintervallet bör hänsyn tas till patientens symptom och maximal dosyndom. Doseringsintervallet ska vara minst 6 timmar. Rekommenderad maximal dosyndom ska aldrig överskrida.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symptom. Kontakta läkaren omedelbart om du har en infektion och symptomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2). Läkaren ser även till att du har fått tillräckligt med viktiga för att minska risken för biverkningar på njurerna.

Du bör endast ges detta läkemedel om behandling med tabletter inte är möjlig. Du måste byta till behandling med tabletter så snart som detta är möjligt.

Detta läkemedel kommer att ges till dig under sárt tid som möjligt. Behandlingstiden ska inte överstigna 3 dagar.

Administreringsätt

För intravenös användning. Lösningen ska ges som en intravenös infusion under 30 minuter.

Inspektera lösningen före användning. Lösningen ska kasseras om partiklar syns.

Om du ges för stor mängd av ibuprofen B. Braun

Eftersom dosen kontrolleras av en läkare eller sjukskötars är det osannolikt att du får för stor mängd av lösningen. Om du får i dig för stor mängd läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringning i öronen, förvirring, bristande koordination (ataxie) och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Vid hög doser har dessutom, bröstmäst, hjärtklapning, medvetlöshet, krampfall (främst hos barn), svaghet och vresl, blod i urinen, frusenhet, och andningsvärtighet rapporterats.

Du kan också drabbas av lågt blodtryck, bläckigt misfärgning av hud eller slimmhinnor (cyanosis), blödning i mage eller tarm samt problem med lever- eller njurfunktion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjukskötars.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar kan minimeras genom att använda den längsta effektiva dosen under kortast möjliga tid som behövs för att behandla symptom. Du kan få en eller flera av de kända biverkningarna av NSAID-säparat (se nedan). Om du upplever någon av dessa biverkningar ska behandlingen med detta läkemedel avbrytas och du ska kontakta läkare så fort som möjligt.

Den vanligaste observerade biverkningarna påverkar mage och tarm. Peptika sår (sår i mag och tarm), hår i mag- eller tarmvägen (härmor) eller blödning från mage eller tarm, ibland livstidande, kan förekomma. Matsmältningssbesvär, tjärikande avföring, blodiga kräkningar, inflammation i munnen särskilt med särblidning (ulceros stomatit), förvärldad infektionsatt (tjocktarmen (kolit) och Crohns sjukdom har rapporterats. Magtart (gastrit) har observerats i mindre viktiga fall. I synnerhet är risken för blödning i mage och tarm till följd av doseringstid och behandlingsstid.

Vätskeansamning (ödem), högt blodtryck och hjärtats kapacitet har rapporterats i samband med NSAID-behandling. Ibuprofen kan ha ett samband med en liten ökad risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) och stroke.

Mycket sällsynt fall av allvarliga allergiska reaktioner inklusive reaktioner vid infusionsställer, anafilaktisk chock och allvarliga biverkningar på huden som t.ex. bläcklärande reaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrom och tuktisk epidermal nerklysning (Lyells syndrom), erythema multiforme och allergisk infektionsatt i blodskålen har rapporterats.

Mycket sällsynt fall för förvärldad infektionsatt i samband med infektioner (t.ex. utveckling av en sjukdom som först väntades vara kallaksos (krohnit) som sammanfaller med användningen av NSAID-preparat har rapporterats.

I enstaka fall kan allvarliga hudinfektioner och mykuvävnadskomplikationer förekomma under en vattakoppsinfektion.

Mycket sällsynt fall av allvarliga allergiska reaktioner vid infusionsställer (legitimus) eller blödning från huden som t.ex. bläcklärande reaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrom och tuktisk epidermal nerklysning (Lyells syndrom), erythema multiforme och allergisk infektionsatt i blodskålen har rapporterats.

Mycket sällsynt fall för förvärldad infektionsatt (härmor) eller slapp, spesiell hår hos ibuprofen.

Minne vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

• Huvudvärk och vresl.

• Halsbrämma, buksmärta, illamående, kräkningar, väderspänning, diaré, förstoppling och smärre blödningar i mage och tarm som i enstaka fall kan orsaka blodbrist.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

• Vresl.

• Hudreaktioner.

• Smärta och brännande känsla vid administreringsställer.

• Sår i mag-tarmkanalen, möjligen med blödning och perforation. Muninflammation med sår (ulceros stomatit), förvärldad tjocktarmssinflammation (kolit) och Crohns sjukdom.

Minne vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

• Sömnstörningar, upphetsning, irritabilitet eller trötthet, ångest och rastlöshet.

• Synstörningar.

NO – Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Braun Melsungen AG - 34209 Melsungen, Tyskland

Ibuprofen B. Braun 200 mg infusionsväskes, oppløsning ibuprofen

Les nöye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

- Ta være på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.

- Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever biverkninger, inkludert mulige biverkningar som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I detta pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva ibuprofen B. Braun är och vad det brukas mot

2. Hva du må vite för du får ibuprofen B. Braun

3. Hvarom ibuprofen B. Braun går

4. Mulige biverkninger

5. Hvordan ibuprofen B. Braun oppbevares

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva ibuprofen B. Braun er og hva det brukas mot

Ibuprofen tilhører en gruppe legemidler som kalles «ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler» eller NSAIDs.

Dette legemidlet brukas til utedom og barn som veier 20 kg eller mer og som er 6 år eller eldre, for kortvarig behandling av akutte, moderate smerte og feber. Det vil bli gitt via blodårene (intravenös) när dette er hensiktsmessig i tilfeller der andre måter å gi legemidlet på ikke er mulig.

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte och rödhet i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).

Detta legemidlet kan också brukes för att lindra smerte i huden (läkemedel mot artrose).