

**Fl - Pakkaukseloste: Tietoa käyttäjälle****Ibuprofen B. Braun 400 mg infuusioneste, liuos**

ibuprofeeni

**Lue tämä pakkaukseloste huollollisesti ennen kuin sinulle annetaan tästä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkaukseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kyyttävää, käännä lääkärin tai sairaanhoidajan puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännä lääkärin tai sairaanhoidajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkaukselostessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkaukselosteessa kerrotaan**

1. Mitä Ibuprofen B. Braun on ja mihin sitä käytetään
2. Miten Ibuprofen B. Braun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Ibuprofen B. Braun -valmistetta
3. Miten Ibuprofen B. Braun sisältää natriumia
4. Miten haittavaikutukset
5. Ibuprofen B. Braun -valmisteen säälyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoja

**1. Mitä Ibuprofen B. Braun on ja mihin sitä käytetään**

Ibuprofeeni kuuluu tulehduskulääkeihin lääkeyrhmään.

Täti lääketäytävät aiukseen akutun keskivaikean kiven lyhytkosteiseen oireennukseen hoitoon ja kuumeen lyhytkosteiseen oireennukseen hoitoon silloin, kun lääkkeen antamisen laskimella on kiilteistä perusteltavat eivätkä muut antotavat ole mahdollisia.

Ibuprofeeni, jota Ibuprofen B. Braun sisältää, voidaan jokaisista myös muiden kuin lääkekuusallotessa mantertuuttia sairauskiin tarvittaessa ja noudata aina heitä saatamia ohjeita.

**2. Miten tietettävä, ennen kuin sinulle annetaan Ibuprofen B. Braun -valmistetta**

Ibuprofen B. Braun -valmistetta ei saa antaa:

- jos olet allerginen ibuprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luettelut koossa 6)
- jos sinulla on ollut hengenvaihdon, astmaa, ihottuma, ruaha ja nenän kuituna tai kasvojen turpanoista, kun olet alkaisemissa ottaneet ibuprofeenia, asteittaisuilla syöpäpaineilla tai hengenvaihdon, varsinainen
- jos sinulla on jokaisista, joita lääkäri voi tarvita, verotuotopainumaista, tai aktiivinen verenuuto,
- jos sinulla on tai aiemmin ollut mahavaara tai mahalaukon verenuuto tai puhkeama, kun olet ottanut tulehduskulääkejä
- jos sinulla on ilmenyt myös raskauden tai suoliston verenuuto tai muu aktiivinen verenuuto
- jos sinulla on valkeita kiuviuksia (loksentelin, ripulin tai riittämättömän nesteen saanniuksia)
- jos olet raskaana raskauden viimeisellä kolmanneksesta.

**Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai sairaanhoidajan kanssa ennen kuin käytät tästä lääkettä.

Ibuprofeenin kaltaisesta tulehduskulääkeiden käytöstä voi liittyä pieni sydänkohtauskaa tai aivovalkuauksia riukkuunen, erityisesti kun niitä käytetään suruina annoksiin. Suositella annosta tai hoidon kestoa ei pidä yliästä.

**Ihrekkatöt**

Vakavista ihrekkatöistä ja sairaanhoidojan kannsa ennen kuin käytät tästä lääkettä. Lopeta Ibuprofen B. Braun -valmisteen käytön ja hoidon välttämistä, ja sairaanhoidon, tai aivovalkuauksien riukkuunen, erityisesti kun niitä käytetään suruina annoksiin.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Ibuprofeenin kaltaisesta tulehduskulääkeiden käytöstä voi liittyä kipulääkejä, mutta ainoastaan suruina annoksiin.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin tai lääkärin terveydenhuoltoon, minkä jälkeen lääkäri voi tehdä lääkettä.

Jos ihrekkatötä on ilmestynyt, kutsutaan lääkärin

**Körförstånd och användning av maskiner**

Vid engångs- eller korttidsanvändning har detta läkemedel ingen eller försämbar effekt på förhållande till framförda och använda maskiner. Eftersom biverkningar i form av trötthet och ysel är vanekomma, kan dock reaktionsförmågan och förmågan att kora bil och/förvara använda maskiner påverkas. Detta gäller särskilt vid kombination med alkohol. Du är själv ansvarig för att bestämma om du i kontaktet till framförda och använda maskiner ska förvara. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa situationer är användning av läkemedel på grund av dess effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bärtsedd el för vägledning. Diskutera med din läkare och apotekspersonal om du är osäker.

**Ibuprofen B. Braun innehåller natrium**

Dette läkemedlet innehåller 358 mg natrium (ibuprofendisensin i kolksalt/bordsalt) per flaska. Detta motsvarar 17,9 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

**3. Hur du får Ibuprofen B. Braun**

Detta läkemedel ordnas av en läkare och ges till dig av en läkare eller sjuksköterska i en miljö där lämplig utrustning finns tillgänglig. Rekommenderad do för vuxna är 400 mg intravenöst (som dropp i en ven), var 6:e till 8:e timme efter behov. Den högsta dagliga dosen på 200 mg ska inte överskrivas. Den längsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtom. Kontakta läkaren omedelbart om du har en infektion och symptomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2). Läkaren ser även till att du har fått tillräckligt med vätska för att minska risken för biverkningar på njurarna.

Användning ska begränsas till situationer när behandling med tablett(er) är olämplig. Patienter måste byta till behandling med tablett(er) så snart som detta är möjligt.

Detta läkemedlet är endast avsett för akut körtidsbehandling och ska inte användas i mer än 3 dagar.

**Administreringsstätt**

För intravenös användning. Lösningen ska ges som en intravenös infusion under 30 minuter.

Läkemedlet är avsett för engångsbruk. Inspektera lösningen före användning. Lösningen ska kasseras om partiklar syns eller om den är missfärgad.

**Om du ges för stor mängd av Ibuprofen B. Braun**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av missat kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen [tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland] för att rådgivning.

Om du troar att du har fått för stor mängd ibuprofen ska du omedelbart rådfråga läkare och sjuksköterska.

Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ågonrörelser. Vid höga doser har dässigt, bröstmärta, hjärtklappning, medvetlöshet, krampanfall (främst hos barn), bristand-samordning av muskelreflexer, svaghets- och ysel, blod i urinen, frusenhet och blandnings-besvär, buksmärta, tjärlökande avföring, blodig kräkning, ulcerös stomatit (inflammation i munhålan), avföring (förvärtrad kolit (inflammation i tjecktarmen)) och Crohn's sjukdomar har rapporterats. Gastrit (magkatarr) har observerats i mindre variationer. Äldre patienter som är sårbara mot läkemedlet rapporterar att det läkemedlet löper högre risk för att utveckla problem i samband med biverkningar.

Vanligast rapporterade biverkningar är biverkningar i mag-tarmkanalen (påverkar mage och tarm). Peptiska sår (sår i mage eller tarm), perforation (hål i mag- eller tarmvägen) och blödning från mage eller tarmar, ibland livshotande, hos äldre, kan förekomma. Illamånde, kräkningar, diaré, väderspänning, förstopning, matsmätningsbesvär, buksmärta, tjärlökande avföring, blodig kräkning, ulcerös stomatit (inflammation i munhålan) och Crohn's sjukdomar har rapporterats. Gastrit (magkatarr) har observerats i mindre variationer. Äldre patienter som är sårbara mot läkemedlet rapporterar att det läkemedlet löper högre risk för att utveckla problem i samband med biverkningar.

Öten (vätskeansättning i värnrum), högt blodtryck och hjärtattack har rapporterats i samband med NSAID-behandling. Läkemedlet som ibuprofen kan ha ett samband med en litet risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) eller stroke.

Mycet sällsynt fall av allvarliga allergiska reaktioner (inklusive reaktioner vid infusionsstället, anafilaktisk chock) och allvarliga biverkningar på huden som t.ex. bullösas (blåslådande) reaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nerklys (Lyells syndrom), erythema multiforme, alopex (håravfall), huden blir ljuskänslig och allergisk vaskulit (inflammation i blodkärl) har rapporterats.

Mycet sällsynt fall av förvärtrad inflammation i samband med infektioner (t.ex. utveckling av nerkötterasfasit) som sammanfaller med användning av NSAID-preparat har rapporterats.

I enstaka fall kan allvarliga hudinfektioner och mjukvävnadskomplikationer förekomma under en vattkopplad infektion.

**Mycet vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):**

• Trötthet eller sömnöslhet, huvudvärk och ysel.

• Hufreaktion.

• Smärtor och brännande känslor i huden.

• Sår i mag-tarmkanalen, möjligen med blödning och peristole. Muninflammation med sår (ulcerös stomatit), förvärtrad tjeckarminfiammation (kolit) och Crohn's sjukdom.

**Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):**

• Sömnöslighet, upphetsning, irritabilitet eller trötthet, ångest och rastlöshet.

• Synstörningar.

• Tinnitus (brörringningar).

**4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar kan minimeras genom att använda den längsta effektiva dosen under kortast möjliga tid som behövs för att behandla. Du kan få en eller flera av de kända biverkningarna av NSAID-reparat (se nedan). Om du upplever några av dessa biverkningar ska behandlingen med detta läkemedlet avbrytas och du kontaktar läkare så fort som möjligt. Äldre patienter som är sårbara mot läkemedlet rapporterar att det läkemedlet löper högre risk för att utveckla problem i samband med biverkningar.

Vanligast rapporterade biverkningar är biverkningar i mag-tarmkanalen (påverkar mage och tarm). Peptiska sår (sår i mage eller tarm), perforation (hål i mag- eller tarmvägen) och blödning från mage eller tarmar, ibland livshotande, hos äldre, kan förekomma. Illamånde, kräkningar, diaré, väderspänning, förstopning, matsmätningsbesvär, buksmärta, tjärlökande avföring, blodig kräkning, ulcerös stomatit (inflammation i munhålan) och Crohn's sjukdomar har rapporterats. Gastrit (magkatarr) har observerats i mindre variationer. Äldre patienter som är sårbara mot läkemedlet rapporterar att det läkemedlet löper högre risk för att utveckla problem i samband med biverkningar.

Öten (vätskeansättning i värnrum), högt blodtryck och hjärtattack har rapporterats i samband med NSAID-behandling. Läkemedlet som ibuprofen kan ha ett samband med en litet risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) eller stroke.

Mycet sällsynt fall av allvarliga allergiska reaktioner (inklusive reaktioner vid infusionsstället, anafilaktisk chock) och allvarliga biverkningar på huden som t.ex. bullösas (blåslådande) reaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nerklys (Lyells syndrom), erythema multiforme, alopex (håravfall), huden blir ljuskänslig och allergisk vaskulit (inflammation i blodkärl) har rapporterats.

Mycet sällsynt fall av förvärtrad inflammation i samband med infektioner (t.ex. utveckling av nerkötterasfasit) som sammanfaller med användning av NSAID-preparat har rapporterats.

I enstaka fall kan allvarliga hudinfektioner och mjukvävnadskomplikationer förekomma under en vattkopplad infektion.

**Mycet vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):**

• Trötthet eller sömnöslhet, huvudvärk och ysel.

• Hufreaktion.

• Smärtor och brännande känslor i huden.

• Sår i mag-tarmkanalen, möjligen med blödning och peristole. Muninflammation med sår (ulcerös stomatit), förvärtrad tjeckarminfiammation (kolit) och Crohn's sjukdom.

**Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):**

• Sömnöslighet, upphetsning, irritabilitet eller trötthet, ångest och rastlöshet.

• Synstörningar.

• Tinnitus (brörringningar).

**5. Hur Ibuprofen B. Braun ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Ärva särskilda förvaringsanvisningar.

Ärva omedelbart efter öppnandet.

Endast för engångsbruk. Oanvänt lösning ska kasseras.

Ärva utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumen är den sista dagen i angiven månad.

Ärva endetta läkemedel om du märker några synliga partiklar eller missfärgning.

**6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar****Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är ibuprofen. En 100 ml flaska innehåller 400 mg ibuprofen.

- Övriga innehållsämnen är L-arginin, natriumklorid, saltsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätorskör.

**Läkemedlets utseende och förpackningsstörlek**

Läkemedlet är fört in i en plastflaska med knölar under huden och blåor huvudsakligen i huvudet.

• Större ibuprofen (snabb hjärtfrekvens), hjärtsvikt, hjärtinfarkt.

• Återig skräckreaktioner med autoimmuna sjukdomar (SLE, blandade bindvävs-sjukdomar) verkar vara känsligare.

• Infektioner i matströparen (blodkärl i matströparen), komplikationer med fickor i tjeckarmen, orsaka blödning.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamående, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamående, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.

• Återig hjärnhinneinfiammation (nackselhet), huvudvärk, illamånde, kräkningar, feber och förtur.